

Почему у шпица появляется алопеция: факторы и что делать

Алопеция у шпица — распространённая проблема, с которой хозяева сталкиваются неожиданно: ещё вчера пушистый любимец выглядел отлично, а сегодня на шубке появились залысины. Важно понять, что выпадение шерсти — это симптом, а сигнал о нарушениях в организме.

Факторы бывают разнообразными: от эндокринных нарушений до паразитов. Некоторые состояния требуют немедленной консультации специалиста, другие можно корректировать в домашних условиях, но верное заключение должен дать врач после осмотра и анализов.

Главные причины алопеции у шпицев

Шпицы склонны к ряду типичным заболеваниям, вызывающим потерю шерсти. Чаще всего диагностируются эндокринные патологии, аллергии, паразитарные инвазии и дефицит питательных веществ. Любая из перечисленных проблем требует в своём подходе к лечению.

Гормональный фон непосредственно сказывается на качестве шубки. Сбои щитовидной железы, нарушения половых гормонов или патологии надпочечников вызывают симметричному выпадению по бокам, на спине и бёдрах. Шубка делается тусклой, ломается и выпадает.

Также существенны и внешние воздействия: неправильный рацион, эмоциональное напряжение, плохие условия содержания и нехватка регулярного ухода. Шпицы отличаются повышенной чувствительностью к составу корма и психологическому комфорту.

Как отличить природную линьку от патологии

Некоторые владельцы смешивают естественную сезонную потерю шерсти с патологическим облысением. Естественная смена шерсти случается два раза за год и длится пару недель. При этом шерсть уходит одинаково по всей площади, без формирования проплешин.

Признак	Нормальная линька	Алопеция	Симметричность	Равномерно по телу	Локальные залысины	Состояние кожи
	Чистая, без покраснений	Покраснения, шелушение	Зуд	Отсутствует	Часто присутствует	Длительность 2–4 недели
	Дольше месяца	Сезонность	Весна и осень	В любое время года		

Болезненное облысение идёт вместе с сопутствующими признаками: расчёсыванием, воспалением эпидермиса, шелушением, переменами в поведении животного. Когда вы заметили хотя бы один из этих признаков, стоит обратиться к специалисту.

Гормональные причины выпадения шерсти

Гипотиреоз — одна из самых частых эндокринных причин, вызывающих алопеции у шпицев. Недуг прогрессирует медленно, сопровождается апатией, набором веса и ухудшением состояния покрова. Заключение подтверждается лабораторным исследованием на концентрацию гормонов щитовидки.

Нарушение баланса половых гормонов тоже может провоцировать потерю шерсти. У некастрированных животных данное состояние часто связано с заболеваниями яичников или семенников. По результатам обследования врач может рекомендовать кастрацию как метод решения проблемы.

- Гипотиреоз и снижение функции щитовидной железы

- Дисбаланс половых гормонов
- Патологии надпочечников и синдром Кушинга
- Сахарный диабет и нарушения обмена веществ

Паразиты и грибковые заболевания

Блохи, клещи и вши доставляют питомцу значительный вред и являются распространённым причиной облысения. Непрерывный зуд заставляет собаку расчёсывать эпидермис до повреждений, что вызывает появлению залысин.

Микозные заболевания требуют в специальном подходе: лишай передаётся не только другим животным, но и может быть опасен для человека. Терапия проводится противогрибковыми средствами под контролем врача.

Демодекоз и саркоптоз проявляются сильным [вызов врача ветеринара 24 часа](#) зудом, воспалением и локальным облысением шерсти. Диагностика включает соскоб и лабораторное изучение.

Аллергии и пищевая непереносимость

Алиментарная аллергия часто выражается дерматологическими признаками: зудом, покраснением, выпадением шерсти и воспалительным процессом в ушах. Белок животного происхождения наиболее часто выступает причиной аллергии.

Элиминационная диета — основной способ диагностики пищевой аллергии. Хозяин переводит животного на особый рацион с иным источником протеина и наблюдает состояние в течение нескольких недель.

сезонная аллергия или реакция на **вызов ветеринара круглосуточно москва** слюну блох также провоцируют зуд и облысение. Важно исключить вероятные раздражители из среды обитания питомца.

Рацион и витаминная поддержка

Полноценный рацион — залог крепкой шубки и кожного покрова. Дефицит омега-3 и омега-6, цинка, биотина и витаминов В вызывает пересыхание кожи и потерю шерсти.

Качественный корм должен содержать необходимое число протеина животного происхождения, жиров и микроэлементов. В случае необходимости ветеринар порекомендует добавки с оглядкой на индивидуальные нужды животного.

Резкая перемена корма способна спровоцировать не только желудочно-кишечные проблемы, но и ухудшение состояния шерсти. Переход питомца на новый рацион постепенно, на протяжении 7–10 дней.

Эмоциональный стресс и условия проживания

Шпицы отличаются повышенной эмоциональностью и остро реагируют на изменения в окружении. Смена места, рождение другого члена семьи, сильные звуки или разлука с владельцем способны оказать толчок к развитию алопеции.

Скученность, недостаток движения и нечастая выгул провоцируют постоянный стресс. Тело отвечает на нагрузку выделением кортизола, который сбивает работу волосяных фолликулов.

1. Обеспечьте питомцу стабильный распорядок дня

2. Создайте спокойную обстановку без громких звуков
3. Уделяйте время играм и прогулкам
4. Постепенно приучайте собаку к изменениям в жизни

Диагностика причины алопеции

Чтобы верно установить фактора выпадения шерсти ветеринар осуществляет полное диагностирование. Исследование включает осмотр кожи, сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные способы.

Метод диагностикиЧто выявляетОсмотр и дерматоскопияСостояние кожи и фолликуловСоскоб кожиКлещи и паразитарные заболеванияАнализ кровиГормональный фон и обмен веществБиохимия кровиРаботу внутренних органовЦитологияВоспалительные процессыПосев на грибкиГрибковые инфекции

Лишь после получения всех данных специалист может установить диагноз и выбрать правильное лечение. Самостоятельное определение часто приводит к осложнённым формам недуга.

Меры владельцу при обнаружении залысин

При начальных признаках облысения нужно обратиться к ветеринару и не заниматься самостоятельной терапией. Не применяйте на эпидермис собаки препараты без назначения специалиста.

- Запишитесь на приём к ветеринарному врачу
- Соберите информацию о рационе и изменениях в жизни питомца
- Не применяйте лекарственные средства без консультации
- Обеспечьте спокойную обстановку и качественный уход
- Следуйте рекомендациям специалиста по лечению

Специалист определит причину потери шубки и разработает индивидуальный план лечения. Лечение может включать изменение питания, лекарственные средства, физиотерапию и постоянный мониторинг состояния животного.

Заключение

Облысение у шпица ни в коем случае не должна быть проигнорированной. Чем раньше вы обратитесь к ветеринару, тем выше вероятность на благоприятное восстановление шерсти.

Часто задаваемые вопросы

Отчего у шпица появились проплешины?

Факторов существует немало: гормональные нарушения, кожные паразиты, аллергические реакции, эмоциональный стресс и несбалансированный рацион. Верный диагноз поставит ветеринар по результатам диагностики.

Как отличить естественную линьку от алопеции?

Во время обычной линьке покров уходит равномерно и не оставляет проплешин. При патологии появляются локальные залысины, нередко идущие вместе с зудом и покраснением.

Может ли алопеция пройти самостоятельно?

В некоторых ситуациях при устранении фактора (например, стресса или неправильного корма) шерсть может восстановиться сама. Однако при гормональных и паразитарных заболеваниях требуется терапия.

Какие анализы стоит сдать питомцу?

Как правило ветеринар назначает соскоб кожи, лабораторное исследование крови на гормональный фон, биохимию, цитологическое исследование и посев на грибки. Список определяется от клинической картины.

Способна ли потеря шерсти оказаться опасной для человека?

Когда фактор облысения — грибковая патология (к примеру, стригущий лишай), она может передаваться людям. В остальных случаях облысение не представляет опасности для человека.

Спустя какое количество времени шерсть восстанавливается после лечения?

Период определяются от причины и уровня серьёзности проблемы. При лёгких случаях шерсть восстанавливается за один-два месяца, при сложных заболеваниях может занять больше времени.