

Диарея и рвота у кошки: что делать

Понос и рвота у кота — это серьёзный повод для беспокойства. Эти признаки нередко указывает на опасное состояние. Своевременная реакция позволяет начать лечение вовремя.

Диарея и рвота могут быть вызваны разными причинами: погрешностью в питании, вирусом, токсинами, паразитами. Не стоит давать лекарства наугад и не использовать человеческие таблетки. В статье расскажем, какие симптомы должны насторожить, что делать до приезда врача и в каких случаях нужна скорая помощь.

Причины поноса и рвоты у кота

Рвота вместе с жидким стулом приводит к потере воды и солей. Причины можно разделить на несколько групп. К распространённым относят резкую смену корма, кишечные инфекции, интоксикации, заражение простейшими и стресс. Нельзя исключать закупорку, воспалительные процессы и побочное действие препаратов.

- Алиментарные факторы: перекорм
- Инфекции и паразиты
- Отравления: лекарства, химикаты
- Стресс и смена обстановки
- Заболевания органов

Не пытайтесь определить причину самостоятельно по одному симптому. Специалист проверит частоту рвоты и характер стула, соберёт анамнез и может порекомендовать обследование. Пока лучше понаблюдать и фиксировать изменения.

Тревожные симптомы

Степень риска бывает разной, но есть признаки, требующие немедленного обращения. Если вы заметили любого из них, свяжитесь со специалистом без промедления. Задержка приводит к тяжёлым последствиям.

Что наблюдается Риск Неукротимая рвота Обезвоживание и истощение Понос с кровью или чёрного цвета Требуется срочной диагностики Избегает питья Усугубляет потерю жидкости Вялость, апатия Может говорить об интоксикации Неконтролируемые движения Требуют экстренной помощи Заворот Опасное состояние Кровянистая рвота Высокий риск Коллапс Угроза жизни

Повышенного внимания требуют котятами, пожилыми и ослабленными животными. Их организм теряет жидкость стремительнее. Когда страдает малыш, нельзя ждать до утра. Также настораживают постоянные позывы и отсутствие улучшения в течение нескольких часов.

Первая помощь до осмотра

До приезда врача важно не паниковать. Уверенные действия помогают снизить стресс у животного. Уберите опасные предметы: спрячьте лекарства и химикаты. Не давайте лекарства без назначения — опасно для питомца.

- Оставайтесь спокойными
- Обеспечьте безопасное место
- Не используйте средства для людей
- Слегка прижмите рану
- Соберите информацию о токсине
- Не поите насильно

Соберите сведения для специалиста: как давно это началось, что ел за последние сутки, мог ли чем-то отравиться, есть ли слабость или отказ от воды. Запишите важные детали — позволит выбрать тактику.

Помощь в зависимости от ситуации

При кровотечении приложите чистую ткань или бинт. Если <https://www.ecmo.ru/mediacategories/obzory-119/kak-izmerit-temperaturu-koshke-i-sobake-bez-stressa> питомец задыхается не трогайте то, что глубоко. При ожогах охладите участок холодной водой. При укусах успокойте животное. Во всех случаях не принимайте самостоятельных решений.

Частые вопросы владельцев

Многие владельцы теряются, при таких симптомах. Далее приведены частые ситуации и разъяснения. Помните, что решение принимает врач.

- Стоит ли давать сорбенты
- Нужно ли поить насильно
- Стоит ли давать еду
- Что указывает на токсин
- В каких случаях нужен срочный вызов

Каждый случай индивидуален. Средство, сработавшее у одного животного, не подойдёт вашему. Поэтому при сомнениях лучше позвонить ветеринару и уточнить состояние.

Когда вызывать специалиста

Если рвота и понос однократные и питомец активен, допустимо понаблюдать недолго. Однако при ухудшении — свяжитесь со специалистом. Обезвоживание у кошек нарастает стремительно.

Чтобы оценить обезвоживание, осторожно приподнять складку кожи: если она расправляется сразу, можно наблюдать. Если складка остаётся — это признак обезвоживания. Не применяйте средства без рекомендации — может навредить.

При необходимости, опишите симптомы оператору и оставайтесь на связи. Специалист подскажет, что делать до приезда врача. Это позволяет не навредить.

Как снизить риск

Чтобы уменьшить вероятность контролируйте питание, храните химикаты в недоступном месте, следите, чтобы питомец не глотал несъедобное. Плановые осмотры позволяют вовремя реагировать.

1. Кормите качественным кормом

2. Обеспечьте доступ к чистой воде
3. Убирайте опасные предметы
4. Проводите обработку от паразитов
5. Наблюдайте и реагируйте

Если у питомца уже было подобное состояние, расскажите об этом врачу. Это важно уточнить картину. Не назначайте препараты самостоятельно.

Заключение

Диарея и рвота у кошки — серьёзный симптом. Не давайте лекарства без назначения и не откладывайте помощь при опасных признаках. Не паникуйте, создайте спокойные условия и получите консультацию.

Важно помнить: при раннем реагировании риски ниже. Наблюдательность снижает вероятность осложнений.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли давать сорбенты при таких симптомах

Без назначения ветеринара не используйте лекарства, включая уголь. Опасно для питомца. Обратитесь к специалисту.

Стоит ли давать воду через шприц

Вливать жидкость через силу не стоит: питомец может захлебнуться. При отказе от питья требуется помощь специалиста.

Можно ли кормить кота при рвоте и поносе

Заставлять есть не нужно. При отказе от еды следует получить рекомендации. Что и когда давать назначит ветеринар.

Как понять, что у кота отравление

Заподозрить отравление помогают такие сигналы: рвота, понос, слабость, повышенное выделение слюны, судороги, потеря сознания. Окончательный вывод устанавливает врач.

В каких случаях нужна срочная помощь

Не откладывайте вызов если рвота повторяется, появлении крови, отказе от воды, апатии, припадках.

Можно ли вызвать врача ночью

Разумеется, врача можно вызвать в любое время. Это помогает, если симптомы появились вечером. Сообщите детали и получите инструкции.